


Chiroxy PO₂ Cream 50 ml



Chiroxy PO₂ kräm innehåller oxigen, inkapslat i nanosomer som ökar syresättningen i huden och i vävnaderna. Nanosomer är mikro-partiklar som möjliggör ökad penetration i huden och därmed ökar den cellulära andningen och hjälper vävnadernas snabbare regeneration.



Krämen rekommenderas inte bara före olika ingrepp och behandlingar, Ex: Fraxel, ILP, Laser, kemisk peeling, operativa ingrepp där krämen förbereder huden för bättre resultat, utan även efteråt för en snabbare regeneration och återhämtning. Chiroxy PO₂ krämen är också en utmärkt hjälp för patienter med nedsatt cirkulation i huden och i benen.

Användning: Applicera Chiroxy PO₂ krämen två gånger om dagen ca 15 dagar före behandling eller operation för optimal förberedelse av huden. Det går att använda krämen direkt efter en behandling och vid operativa ingrepp, efter stygntagning.



Chiroxy PO₂ krämen ger snabbare sårhäkning och finare postoperativ ärrhäkning.



Diabetiskt bensår efter två månaders behandling med Chiroxy PO₂ krämen.

Marknadsförs av:
DrLetterfors® AB
Jönköping, Sverige
www.drletterfors.se



Tillverkas av:

